

- 4 塞劑放入陰道後的數分鐘應保持躺姿，不要站起或走動，因此最好在睡前進行。
- 5 使用後用肥皂及清水徹底洗淨雙手及送藥器。



注意

1. 塞劑於室溫下呈凝固狀態，於體溫下才會融化，並發揮藥效。因此，若儲存的溫度高於體溫時，會極易產生軟化、變形等現象。塞劑如軟化或融化時，可將原包裝浸於冷水中凝固。
2. 藥品使用前應維持藥廠原包裝，不應自行拆裝，以免藥物失效變質。
3. 藥物會在體溫下軟化，使用後如有黏稠或水液狀之液體自陰道流出，屬正常現象。可在內褲底部墊衛生棉墊，勿立即沖洗陰道。

4. 晚上睡覺前用藥，可延長藥物停留在陰道的時間，從而提高療效。
5. 即使症狀消失，仍須繼續使用陰道塞劑，直至整個療程完畢。
6. 月經期間仍要繼續用藥，不可擅自中斷用藥。
7. 孕婦不可使用陰道送藥器，以避免刺激陰道，造成子宮收縮而導致流產。
8. 用藥期間應避免發生性行為，或請男性使用安全套，以避免交叉感染。

此藥物指引只供參考之用。
用藥應按照醫生指示。
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢。
切勿將自己的藥物給予他人使用。

如有任何查詢，歡迎聯絡我們
For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院
Address: St. Paul's Hospital
No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話 Tel: 2830 3725
網址 Website: www.stpaul.org.hk

Ref. No.: PHAR-08 Ver.4 Updated: 04/2022




聖保祿醫院
St. Paul's Hospital

陰道塞劑 使用方法

藥劑部
Pharmacy



使用陰道塞劑的方法



- 1 用肥皂及清水徹底清潔雙手。





- 2 先將塞劑的頭部塗凡士林(Vaseline)·或沾點溫水潤滑，有助推入陰道。



3.1 徒手給藥法

仰臥床上，兩腿曲起向外張開，用食指及中指把陰道塞劑推入陰道口。放妥後，輕輕將塞劑用手指推送入陰道深處 3-5 厘米，避免滑出。



3.2 送藥器給藥法

將塞劑較小的一端放入送藥器的杯形尾端。曲腿將送藥器插入陰道，深度只要能順利插入即可。然後輕輕的壓下活塞，把塞劑推入陰道內，然後可將送藥器從陰道取出。

