



注意

1. 切勿使用已變色、變壞或過期的灌腸劑。
2. 將灌腸劑的導入嘴插入肛門時，勿用力過猛。
3. 除非有特別指示，否則只要將灌腸劑放在室內陰涼乾燥處，避光儲存即可，毋須冷藏。

此藥物指引只供參考之用。
用藥應按照醫生指示。
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢。
切勿將自己的藥物給予他人使用。

如有任何查詢，歡迎聯絡我們 For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院

Address: St. Paul's Hospital, No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong

電話 Tel: 2830 3725

網址 Website: www.stpaul.org.hk

Ref. No.: PHAR-15 Ver.4 Updated: 04/2022



灌腸劑使用方法

藥劑部
Pharmacy



使用方法



1 清潔雙手。

2 戴上用完即棄的膠手套。



3 使用灌腸劑之前，把灌腸劑放在置有溫水的臉盆或大杯子內約 10 分鐘，使藥液接近體溫。



4 插入前，將灌腸劑導入嘴上的保護蓋除去。

5 側臥，下腳伸直，上腳向前屈曲。兒童可伏在成人的大腿上。



6 放鬆肛門，溫和平穩地將灌腸劑的導入嘴插入肛門。

7 擠壓瓶身直到藥液完全進入。

8 將雙腿合攏，維持側臥姿勢約 5-10 分鐘，以防藥液過早排出。



9 將藥液排出體外。

10 棄掉用完即棄手套，並以梘液及清水洗手。

