



檢查計量器

每次使用鼻噴霧劑後於計量器上顯示的數字會改變。所顯示的數字代表您已噴了多少次。此鼻噴霧劑保證可使用14次。



當計量器上顯示的數字為16時，表示您已噴了16次，且鼻噴霧劑已用完。您可能看見少許溶液遺留於噴霧瓶內，此為正常。


注意

為使藥劑容易噴出，使用時應注意：

- 盡量保持瓶身直立向上。
- 需用力、快速的往下按，藥劑才會完全噴出。
- 絕不可搖晃鼻噴霧瓶，因會產生氣泡而影響劑量。

儲存方式

- 鼻噴霧劑未開封前應放於雪櫃保鮮格(2~8°C)，勿冰凍。
- 開封後，可儲存於室溫下(不超過25°C)，並於四週內使用。
- 噴霧瓶應直立放置。



此藥物指引只供參考之用。
用藥應按照醫生指示。
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢。
切勿將自己的藥物給予他人使用。

如有任何查詢，歡迎聯絡我們
For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院
Address: St. Paul's Hospital
No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話 Tel: 2830 3725
網址 Website: www.stpaul.org.hk

Ref. No.: PHAR-01 Ver.4 Updated: 04/2022




使用「密鈣息」 鼻噴霧劑的方法

藥劑部
Pharmacy




初次使用之前


(此步驟只需於開啟一瓶新的鼻噴霧劑時進行)



將保護蓋向上摘除，以直立的方式握住瓶身，將上面的部分向下壓，重覆按壓三次。



壓下第一次時，計量器會顯示出紅白線條；



壓下第二次時，會顯示出白色；



壓下第三次時，則會顯示出綠色。此時，鼻噴霧劑已經準備好可以使用。

使用「密鈣息」的方法

- 1 使用鼻噴霧劑之前，應先將噴霧劑放在室溫地方回溫。

(步驟 1 只限首次使用)




- 2 清理鼻腔內的分泌物。

- 3 摘除保護蓋，以扣押方式拿起鼻噴霧劑。不可搖晃鼻噴霧瓶。




- 4 頭稍前傾，將噴嘴放入鼻孔內。鼻噴霧劑持正，另一邊鼻孔以食指按壓。

- 5 將鼻噴霧劑一次按壓到底。



- 6 移開鼻噴霧劑，然後大力吸氣幾下，以幫助藥水留於鼻內。

- 7 每次使用鼻噴霧劑時應與上一次噴鼻的鼻孔不同，輪流使用，以減低鼻子的不適，及增加藥物吸收。



- 8 用完後，使用乾的紙巾清潔噴嘴後再蓋上保護蓋。